

الرضاعة:

النظام	مدى التكرار	الآثار الجانبية
اضطرابات الجهاز المناعي	تقارير مفصلة	تفاعلات حساسية.
اضطرابات في الأبيض والتغذية	قليلة جدا (> 10000)	نقص الصوديوم في الدم.
اضطرابات نفسية	قليلة جدا (> 10000)	اضطرابات عاطفية.
اضطرابات الجهاز العصبي	شائعة (< 10000)	صداع.
اضطرابات الجهاز الهضمي	شائعة (< 10000)	آلم في البطن، غثيان.
اضطرابات الجلد والطفحة تحت الجلد	قليلة جدا (> 10000)	تفاعلات حساسية في الجلد.

النظام (الجهاز)	مدى التكرار	الآثار الجانبية
اضطرابات الأيض والتغذية	شائعة (< 1.00 / > 1.0)	نقص الصوديوم في الدم.
اضطرابات الجهاز العصبي	شائعة (< 1.00 / > 1.0)	صداع ودوار.
اضطرابات القلب والأوعية الدموية	شائعة (< 1.00 / > 1.0)	دوالي الأطراف.
اضطرابات القناة البولية	شائعة (< 1.00 / > 1.0)	تكرار البتبول.
اضطرابات القناة الهضمية	شائعة (< 1.00 / > 1.0)	آلم في البطن، غثيان، جفاف الفم، زيادة في الوزن.

إن هذا دواء الدواء مستعصر ولكن كثير من المستحضرات الدواء مستعصر يأثر على حسيته واستعمله خلافا للتعليمات بعرض الخطر اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليه في النسخة والصيدالي لها الخبران بالدواء ونفعه وضرره لا تصنع دواء العلاج البدني من تلقاء الطبيب ولا تقبض لا تكون صرف الدواء بدني وصفة وطبيبة		
مجلس وزراء الصحة العرب	لا تترك الأدوية متناولة بين الأطفال	اتحاد الصيدالة العرب

إلى أمراض جانبية، كالنمطور (تسبب على الحمل أو على صحة الجنين)، أو الموليد، وأحياناً كالتواسع معوقات أخرى، خصوصاً، لا تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى تأثير ضار سواء كان مباشر أو غير مباشر بالنسبة للحمل،
النمو الجنين، أو على الطفل قبل أو بعد الولادة، يجب أن يتخذ الاحتياطات عند وصف الدواء لسيدة حامل.